

Manos (Puntos):

<b>Amputación de una mano (a la altura del carpo o metacarpo):</b>		
Unilateral 35-40.	Bilateral 65 .	
<b>Pseudoartrosis inoperable de escafoides: 6.</b>		
<b>Síndrome residual postalgodistrofia de mano: 1-5.</b>		
<b>Material de osteosíntesis: 1-3.</b>		
<b>Amputación completa del primer dedo:</b>		
Unilateral 15-20.	Bilateral 32.	
<b>Amputación completa de la falange distal del primer dedo: 8-10.</b>		
<b>Amputación completa del segundo dedo:</b>		
Unilateral 8-10.	Bilateral 18.	
<b>Amputación completa de la falange distal del segundo dedo: 5-6.</b>		
<b>Amputación completa de la falange media y distal del segundo dedo: 6-7.</b>		
<b>Amputación completa del 3.o, 4.o 5 dedo (por cada dedo): 6-7.</b>		

<b>Amputación completa de la falange distal del 3 o, 4 o 5 dedo (por cada dedo): 3-4.</b>		
<b>Amputación completa de la falange media y distal del 3 o 4 o 5 dedo (por cada dedo): 5-6.</b>		
<b>Anquilosis/artrodesis del primer dedo (se incluyen el conjunto de las articulaciones):</b>		
En posición funcional 7-10.	En posición no funcional 10-15.	
<b>Anquilosis/artrodesis del segundo dedo (se incluye el conjunto de las articulaciones):</b>		
En posición funcional 4-5.	En posición no funcional 5-8.	
<b>Anquilosis/artrodesis de 3 o 4.o 5 dedo (se incluye el conjunto de las articulaciones):</b>		
En posición funcional 2-4.	En posición no funcional 4-6.	
<b>Limitación de la movilidad de las articulaciones metacarpo-falángicas:</b>		

Primer dedo 1-5.	Resto (por cada dedo) 1-2.	Limitación de la movilidad de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo 1-5.
<b>Limitación funcional de las articulaciones interfalángicas:</b>		
Primer dedo 1-3.	Resto (por cada articulación) 1.	
<b>Artrosis postraumática y/o dolor en mano: 1-3 .</b>		