

Pierna-Cadera (Puntos):

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Dismetrías Acortamiento de la extremidad inferior: | | |
| Inferior a 3 centímetros 3-12. | De 3 a 6 centímetros 12-24. | De 6 a 10 centímetros 24-40. |
| Cadera Desarticulación/amputación: | | |
| Unilateral 60-70. | Bilateral 90-95. | |
| Anquilosis/artrodesis: | | |
| En posición funcional 25. | En posición no funcional 25-35. | |
| Limitación de movilidad: | | |
| Flexión (N: 120). Mueve más de 90: 1-5. | Mueve más de 45° y menos de 90: 5-10. | Mueve menos de 45: 10-15. |
| Extensión (N: 20). 1-5. | Aducción (N: 60). Mueve más de 30: 1-3. | Mueve menos de 30: 3-6. |
| Aducción (N: 20): 1-3. | Rotación externa (N: 60). Mueve más de 30: 1-3. | Mueve menos de 30: 3-6. |
| Osteoartritis séptica crónica (según limitación funcional): 20-35. | | |
| Artrosis postraumática (incluye las limitaciones funcionales y el dolor): 1-10. | | |
| Coxalgia postraumática inespecífica: 1-10. | | |
| Necrosis de cabeza femoral :20-25. | | |
| Agravación de artrosis previa: 1-5. | | |
| Prótesis: | | |
| Parcial 15-20. | Total 20-25. | |
| M. de osteosíntesis: 1-10. | | |
| Muslo Amputación de fémur: | | |
| Unilateral, a nivel diafisario o de la rodilla 50-60. | Bilateral, a nivel diafisario o de las rodillas 85-90. | |
| Pseudoartrosis de fémur inoperable: | | |
| Sin infección activa 30. | Con infección activa 40. | |
| Osteomielitis crónica de fémur: 20. | | |
| Material de osteosíntesis: 1-10. | | |
| Anquilosis/artrodesis de rodilla: | | |
| En posición funcional 20. | En posición no funcional 20-30. | |
| Limitación de movilidad: | | |
| Flexión (N: 135). Mueve más de 90: 1-5. | Mueve más de 45 y menos de 90: 5-10. | Mueve menos de 45: 10-15. |
| Extensión: Mueve menos de 10: 4-10. | Mueve más de 10: 1-3. | |
| Osteoartritis séptica crónica: 20-35. | | |
| Artrosis postraumática: 1-10. | | |
| Gonalgia postraumática inespecífica/agravación de una artrosis previa: 1-5. | | |
| Lesiones de ligamentos: | | |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Ligamentos laterales (operados o no) con sintomatología 1-10. | Ligamentos cruzados (operados o no) con sintomatología 1-15. | |
| Prótesis de rodilla: | | |
| Parcial 15-20. | Total de rodilla 20-25. | |
| Material de osteosíntesis: 1-5. | | |
| Extirpación de la rótula (patelectomía): | | |
| Parcial (patelectomía parcial) 1-10. | Total (patelectomía total) 15. | |
| Luxación recidivante inoperable: 1-10. | | |
| Condropatía rotuliana postraumática: 1-5. | | |
| Material de osteosíntesis: 1-3. | | |
| Pierna Amputación: | | |
| Amputación unilateral 55-60. | Amputación bilateral 80-85. | |
| Pseudoartrosis de tibia inoperable: | | |
| Sin infección 25. | Con infección activa 30. | |
| Consolidaciones en rotación y/o angulaciones: | | |
| De 1 a 10: 1-5. | Más de 10: 5-10. | |
| Osteomielitis de tibia: 20. | | |
| Material de osteosíntesis: 1-6. | | |
| Tobillo Amputación a nivel tibio-tarsiano o del tarso: | | |
| Unilateral 30-40. | Bilateral 60-70. | |
| Anquilosis/artrodesis tibio-tarsiana: | | |
| En posición funcional 12. | En posición no funcional 12-20. | |
| Limitación de la movilidad: | | |
| Flexión plantar (N: 45): 1-7. | Flexión dorsal (N: 25) 1-5. | |
| Inestabilidad del tobillo por lesión ligamentosa: 1-7. | | |
| Síndrome residual postalgodistrofia de tobillo/pie: 5-10. | | |
| Artrosis postraumática: 1-8. | | |
| Agravación de una artrosis previa: 1-5. | | |
| M. de osteosíntesis: 1-3. | | |
| Pie Amputación de metatarso y tarso: | | |
| Unilateral 15-30. | Bilateral 30-60. | |
| Triple artrodesis/anquilosis: 10. | | |
| Anquilosis/artrodesis subastragalina: 5-8. | | |
| Limitación de movilidad: | | |
| Inversión (N: 30): 1-3. | Eversión (N: 20): 1-3. | Abducción (N: 25): 1-3. |
| Aducción (N: 15): 1-3. | | |
| Artrosis postraumática subastragalina: 1-5. | | |
| Talalgia/metatarsalgia postraumática inespecíficas: 1-5. | | |

| | | |
|--|--|---|
| Pseudoartrosis astrágalo inoperable: 10-15. | | |
| Deformidades postraumáticas del pie (valgo, varo, etc.): 1-10. | | |
| M. de osteosíntesis: 1-3. | | |
| Dedos: | | |
| Amputación primer dedo 10. | Amputación de resto de los dedos (por cada dedo): 3. | Amputación segunda falange del primer dedo 3. |
| Amputación segunda y tercera falange del resto de los dedos (por cada dedo) 1. | | |
| Limitación funcional de la articulación metatarso-falángica: | | |
| Primer dedo 2. | Resto 1. | |
| M. de osteosíntesis: 1 | | |