

Sistema Osteoarticular (Puntos):

<b>Alteración traumática de la oclusión dental:</b>			
Con contacto dental: Unilateral 5-15; Bilateral 1-5	Sin contacto dental 15-30.		
<b>Deterioro estructural de maxilar superior y/o inferior (sin posibilidad de reparación):</b>			
Valorar según repercusión funcional sobre la masticación 40-75.			
<b>Pérdida de sustancia (paladar duro y blando):</b>			
Sin comunicación con cavidad nasal 20-25.	Con comunicación con cavidad nasal (inoperable) 25-35.		
<b>Limitación de la apertura de la articulación témporo-mandibular (de 0 a 45 mm) según su repercusión: 1-30</b>			
<b>Luxación recidivante de la articulación témporo-mandibular:</b>			
Luxación entre los 20-45 mm de apertura 5-10.	Subluxación recidivante de la articulación témporo-mandibular 1-5.	M. de osteosíntesis 1-8.	
<b>Boca Dientes (pérdida completa traumática):</b>			
De un incisivo 1.	De un canino 1.	Premolar 1.	De un molar 1.
<b>Lengua:</b>			

Trastornos cicatriciales 1-5.	Amputación Menos del 50%: 5-20	Más del 50%: 20-45.	Total 45.
<b>Alteración parcial del gusto:</b> 5-12.			
<b>Nariz:</b>			
Pérdida de la nariz: parcial 5-25.	Total 25.	Alteración de la respiración nasal 2-5.	Sinusitis postraumática 5-12.
<b>Sistema olfatorio y gustativo:</b>			
Disosmia 2.	Hiposmia 3-6.	Anosmia 7.	Anosmia con alteraciones gustativas 7-10.